

Mordeduras de Animales y Humanos

A menudo es necesario solicitar atención médica para toda herida que penetre la piel de los niños, incluyendo mordeduras de humanos. Tal vez necesiten antibióticos para prevenir infecciones potencialmente serias. Algunas heridas por mordedura necesitan puntos (suturas), según su severidad y ubicación.

¿Qué debe usted saber acerca de las heridas por mordedura?

Las heridas por mordedura son comunes en los niños. Éstos pueden ser mordidos por perros, gatos u otros animales. Las mordeduras de humanos también son frecuentes, especialmente en niños en edad preescolar.

A menos que la mordedura de su hijo sea muy pequeña, ésta debe ser evaluada por un profesional médico. Es posible que se le den antibióticos para prevenir una infección causada por los gérmenes de la boca del animal que lo mordió. Las suturas pueden ser necesarias en el caso de mordeduras grandes o las que estén ubicadas en ciertas partes del cuerpo, especialmente la cara. Se pueden prevenir muchas mordeduras de animales enseñando a los niños algunas reglas simples de seguridad.

¿Cómo se ven las mordeduras?

- Las mordeduras de perro parecen raspaduras (abrasiones); heridas punzantes, algunas veces bastante profundas; o desgarros (laceraciones). Las mordeduras de perros grandes o razas más agresivas pueden ser severas.
- Las mordeduras de gato o conejo suelen ser heridas punzantes.
- Las mordeduras de humano pueden ser heridas punzantes cuando los dientes superiores e inferiores se juntan en una parte del cuerpo. Otro tipo de herida por mordedura se produce durante peleas: es posible que la piel del puño se corte o desgarre cuando entra en contacto con los dientes de la otra persona.
- También se observan mordeduras de roedores (ratas y gerbos).

¿Cuáles son las posibles complicaciones de las heridas por mordedura?

- *La infección* es la complicación más común, ya sea la mordedura causada por un animal o un humano. Los gérmenes que ocasionan la infección difieren, según el tipo

de animal. Otros factores importantes son el tiempo transcurrido desde la mordedura, la profundidad de la mordedura y si hay materia extraña en la herida.

- Aunque no son comunes, hay riesgo de ciertas infecciones serias, como el tétanos y la rabia. La vacuna contra la rabia puede ser necesaria en el caso de mordeduras de animales salvajes, especialmente roedores, o perros callejeros.
- También puede haber problemas de *cicatrización* u otra complicación al sanar. La evaluación médica es necesaria para determinar si hacen falta puntos para cerrar la herida.

¿Qué pone a su hijo en peligro de tener heridas por mordedura?

- Las mordeduras de perro son más comunes en niños de 6 a 11 años de edad. La mayoría de las heridas se producen cerca del hogar e involucran un perro que el niño conoce.
- Es más probable que los perros muerdan cuando el niño los está molestando. Esto es especialmente válido en el caso de las perras que están tratando de proteger a sus crías. Sin embargo, algunos perros pueden morder aun cuando no están siendo molestados.
- Es más probable que en las mordeduras de perro serias estén involucradas ciertas razas, por ejemplo, rottweilers y pit bulls.
- Las mordeduras de gato son más comunes en las niñas y normalmente involucran un gato que la niña conoce.
- Las mordeduras de humanos son más comunes en niños en edad preescolar y menores de diez años.
- Los niños mayores pueden sufrir heridas por mordedura durante peleas.

¿Pueden evitarse las heridas por mordedura?

Enseñe a su hijo reglas simples de seguridad sobre los animales:

- No molestar a los animales que están durmiendo o comiendo.
- No acercarse a animales que no conoce.
- No molestar a las perras que están cuidando sus crías.
- No correr cuando un perro lo persiga.
- Dejar que los perros lo vean y huelan antes de tocarlo.

Los padres de familia no deben llevar al hogar animales que muerdan. Evite las mascotas exóticas y razas agresivas.

¿Cuál es el tratamiento para las heridas por mordedura?

- Cualquier mordedura de animal o humano que penetre la piel requiere atención médica. Si su hijo ha sido mordido, llame a nuestro consultorio o vaya a la sala de emergencia.
- El doctor examinará la mordedura y le preguntará cómo ocurrió. Dé toda la información posible acerca del tipo de animal y las circunstancias relacionadas con la mordedura.
- *Prevención de infecciones:*
 - El doctor necesitará saber si su hijo ha sido vacunado contra el tétanos en los últimos 5 ó 10 años. Si no, se le dará una inyección contra el tétanos.
 - En mordeduras de humanos, es importante saber si la persona que mordió a su hijo está infectada con el virus de la hepatitis B o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Si lo está, se le dará medicación para prevenir estas infecciones.
 - En el caso de mordeduras de perro o gato, es importante saber si el animal ha recibido la vacuna de la rabia o si estaba actuando anormalmente. Es posible que su hijo necesite inyecciones contra la rabia si ésta es la recomendación del departamento de salud local. Estas inyecciones también pueden ser necesarias para mordeduras de animales desconocidos o salvajes (por ejemplo, un mapache o un murciélago).
 - El área de la mordedura debe limpiarse y enjuagarse completamente para remover los gérmenes. Es posible que se requiera de cirugía menor para removerlos si alguna parte de la piel ha sido desgarrada.
- *Antibióticos.* Generalmente se recomienda dar antibióticos para:
 - Heridas punzantes.
 - Mordeduras en ciertas áreas (cara, manos, pies y genitales).

- Cualquier mordedura que sea más que sólo una raspadura.
- Es posible que su hijo reciba antibióticos orales o una inyección. Si se le administran antibióticos orales, asegúrese de que tome la cantidad total recetada.
- El tipo de antibiótico depende de la clase de animal que haya producido la mordedura y otros factores. Asegúrese de decirle a su doctor si su hijo es alérgico a la penicilina.
- Puntos y vendajes:
 - Es posible que se recomiende el usar puntos (sutura) para cerrar la herida. Los factores que afectan la necesidad de puntos incluyen la ubicación de la mordedura, el tiempo transcurrido desde la mordedura, el riesgo de infección y el tamaño y profundidad de la mordedura.
 - Las mordeduras en la cara o heridas por mordedura profundas pueden dejar cicatrices feas. Es posible que su doctor recomiende una consulta con el cirujano plástico u otro especialista.
 - Lo más probable es que se aplique un vendaje sobre la herida. Siga las instrucciones del doctor para cambiar los vendajes y mantener la herida limpia.
 - Busque ayuda médica en el lapso de uno o dos días, o como le haya recomendado el doctor.

¿Cuándo debo llamar al doctor?

Llame a nuestro consultorio si se presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Dolor severo.
- Fiebre.
- Enrojecimiento o hinchazón en el área de la mordedura o cerca de ella.
- Pus que drena por la herida.