

# ■ Dientes Presentes al Nacer y Durante el Período Perinatal ■

Los padres a veces se sorprenden al descubrir que el recién nacido ya tiene dientes. En otros casos, los dientes aparecen durante el primer mes de vida. En la mayoría de los casos, los dientes presentes al nacer son la única anomalía. Esto es menos frecuente en los niños que tienen el paladar hendido u otros problemas congénitos raros. Los dientes prematuros se pueden extraer si causan dolor u otros problemas.

## ¿Qué son los dientes que están presentes al nacer o durante el período perinatal?

Los dientes natales están presentes al nacer. Los dientes neonatales son dientes que el bebé desarrolla durante el primer mes de vida. La mayoría de las veces, los dos dientes inferiores centrales son los únicos presentes. Por lo general, están flojos y no fuertemente insertados en la encía como los dientes normales. A veces, son dientes normales que han salido prematuramente. Otras veces, pueden ser dientes adicionales.

Los dientes presentes al nacer son más comunes en bebés que nacen con el paladar hendido y en pacientes que sufren de otras anomalías congénitas. Si el niño no tiene esta condición, en realidad no hay nada de qué preocuparse. Si es necesario, los dientes pueden ser extraídos, especialmente si dañan la lengua o si interfieren con la alimentación de leche materna.

## ¿Cuáles son las posibles complicaciones?

- Las complicaciones son muy pocas o ninguna.
- La complicación más frecuente es el traumatismo e irritación, ya sea de la lengua del bebé o del pezón de la madre en el momento de amamantar.
- A veces existe la preocupación de que los dientes se caigan y el bebé los trague. Sin embargo, muy rara vez ocurre esto.

## ¿Qué aumenta el riesgo de tener dientes natales?

- Si usted u otro miembro de su familia ha tenido bebés con este problema, su bebé puede tener más riesgo.
- El paladar hendido u otros síndromes congénitos asociados con la dentadura natal.

## ¿Cuál es el tratamiento?

- Su bebé será examinado para descartar otras anomalías congénitas (por ejemplo, el paladar hendido u otros síndromes que implican un desarrollo anormal de la mandíbula).
- Se pueden tomar radiografías.
- Normalmente, el tratamiento no es necesario. Si no existen otras anomalías congénitas, esta condición es inofensiva y no causará problemas serios.
- Si se considera necesario, los dientes pueden ser extraídos fácilmente ya que no están tan adheridos a la encía como los dientes normales. La extracción será recomendada si la lengua del bebé está dañada o si hay problemas con los pezones de la madre (si ella está amamantando al niño). Los dientes también pueden ser extraídos si están demasiado flojos.
- Si los dientes no se extraen, hay que observarlos cuando el niño llegue al hogar. No requieren un cuidado especial, simplemente límpielos con un paño húmedo (lo mismo que debe hacerse cuando aparezcan los dientes normales).

## ¿Cuándo debo llamar a su consultorio?

Llámenos si:

- Los dientes le están causando dolor al niño, especialmente si usted nota un corte o irritación en la lengua.
- Los dientes están causando problemas con la alimentación por parte de la madre.
- Los dientes se aflojan.